

ERRATA

VOLUME 72 EDIÇÃO 1 - Jan/Fev 2006

VOLUME 72 EDIÇÃO 3 - Mai/Jun 2006

Tabagismo, abandono do fumo e os otorrinolaringologistas do Estado de São Paulo

Smoking, smoking cessation and otorhinolaryngologists in the state of Sao Paulo, Brazil

Aracy Pereira Silveira Balbani • Jair Cortez Montovani • Lidia

Raquel de Carvalho

Tabela citada na página 100

Tabela 1. Opinião dos otorrinolaringologistas (n=209) sobre a eficácia das opções de tratamento da dependência de nicotina.

Tratamento	Muito eficaz	Pouco eficaz	Ineficaz	Não opinou
Orientação	74 (35,4%)	114 (54,5%)	15 (7,2%)	6 (2,9%)
Bupropiona	53 (25,4%)	97 (46,4%)	10 (4,8%)	49 (23,4%)
Gomas de mascar de nicotina	9 (4,3%)	95 (45,5%)	44 (21,1%)	61 (29,2%)
Adesivos de nicotina	21 (10%)	107 (51,2%)	28 (13,4%)	53 (25,4%)
Acupuntura	17 (8,1%)	96 (45,9%)	27 (12,9%)	69 (33%)
Psicoterapia	64 (30,6%)	94 (45%)	9 (4,3%)	42 (20,1%)

Circunstâncias e conseqüências de quedas em idosos com vestibulopatia crônica

Circumstances and consequences of falls in elderly people with vestibular disorder

Juliana Maria Gazzola • Fernando Freitas Ganança • Mayra

Cristina Aratani • Monica Rodrigues Perracini • Maurício Malavasi Ganança

Correção da ordem dos autores.